

春の清掃美化運動

「美化運動」の目標です。
蚊、はえ、ねずみなど
駆除をはじめ生活環境を清

御協力をお願いします。
毎朝十分間清掃の実行
五月四日から毎朝七時消

はしかの豫防

今年ははしかが多い年

「はしか」という病気は今は一生の中に一度はかかるなければならないといわれるくらい多い病気になります。

現在留萌市で一三一名の患者が出ています。おきに特に多数の患者が出ることが知られています。

今年は多数の患者が出る年に当つていますので、出

来るだけ「はしか」にかかりぬよう、またかつても軽くすむようにしたいと

思います。

はしかは麻疹ダーヴィールス

と呼ぶヴァイーリスの感染によつて起る傳染病で、イン

フルエンザのように「のど

」の上気道を通じてうつります。

が、伝染力が強くはし

かにかゝつたことがない人

が感染すると一〇〇%に近

く发病します。

はしかは三月から始ま

つて五月、六月が最も患者

たちは結核などの余病を併發

することがしばくです。

はしかはこんな症状

中には肺炎を起したり、また

は風邪を引いたように熱が

出て頭が痛かつたり、くしゃみが出たりしますが、目

が赤くなり目やにが出るこ

とが一つの特徴といわれて

ます。

はしかに罹りますと初め

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ

はかゝつても軽くすむよう

に濃厚な感染を防ぐことで

そのために、はしかの患者

病しない間、また發病して

一、二日くらいの間であれば、母親の血清やガムマグロブリンという薬を多量に

注射すると軽くすむといわれています。

はしかの予防法として予防住

射が研究されていますが、まだ完成されません。

一番のねらいとするところ