

	乾燥弱毒水痘ワクチン	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
接種回数	1回	2回 (2回目は1回目の接種から2カ月後、遅くとも6か月後までに接種する)
接種方法	皮下注射	筋肉内注射
有効性	50～59歳：69.8% ※1 60～69歳：64.0% 70～79歳：41.0% 80歳以上：18.0%	50～59歳：96.6% ※2 60～69歳：97.4% 70～79歳：91.3% 80歳以上：71.4%
予防効果	5～7年 ※1	10年以上 ※2 (11年目以降は延長試験を実施中)
副反応	◆頻度10%以上の副反応 ※3 発赤 (44.0%)、そう痒感 (18.5%) 熱感 (18.5%)、腫脹 (17.0%) 疼痛 (14.7%)、硬結 (13.5%) ◆重大な副反応 (いずれも頻度不明) アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎	◆頻度10%以上の副反応 ※4 疼痛 (78.0%)、発赤 (38.1%) 腫脹 (25.9%)、筋肉痛 (40.0%) 疲労 (38.9%)、頭痛 (32.6%) 悪寒 (23.5%)、発熱 (17.9%) 胃腸症状 (13.0%) ◆重大な副反応 (いずれも頻度不明) ショック・アナフィラキシー
自己負担額	3,200円	11,000円×2回

【引用文献】

※1 ZostavaxのSPS・ATPS・LTP試験 (50歳代はZEST試験)

国内での有効性について試験を行っていないため、本質的に同じワクチンとされている
Zostavaxの試験結果から引用

※2 Singrix Zoster-006・022・049試験

※3・4 医薬品添付文書 (※4の数字は、Zoster-006・022試験)